

糖尿病用剤に関するヒヤリ・ハット

～規格・剤形間違いのパターン～

ヒヤリ・ハット事例のうち、「糖尿病用剤」に関する事例が206件報告されています。(集計期間：平成25年1月1日～平成25年12月31日)

このうち、規格・剤形間違いに関する事例は42件あり、医薬品と規格・剤形間違いのパターンを以下に示します。

医薬品名	規格・剤形間違いのパターン	報告回数
アカルボース錠「タイヨー」	「50mg」と「100mg」	1
アクトス錠	「15mg」と「30mg」	4
アマリール	「0.5mg錠」と「0.5mgOD錠」	2
	「0.5mg錠」と「1mg錠」	2
	「1mg錠」と「3mg錠」	1
グラクティブ錠	「25mg」と「50mg」	5
グリメピリド錠「三和」	「0.5mg」と「1mg」	1
グリメピリド錠「日医工」	「0.5mg」と「1mg」	1
ジャヌビア錠	「25mg」と「50mg」	2
	「50mg」と「100mg」	1
シュアポスト錠	「0.25mg」と「0.5mg」	1
セイブル錠	「25mg」と「50mg」	1
ネシーナ錠	「6.25mg」と「25mg」	1
	「12.5mg」と「25mg」	1
パミルコン錠	「1.25mg」と「2.5mg」	1
ベイスン	「錠0.2」と「錠0.3」	2
	「錠0.2」と「OD錠0.2」	2
	「OD錠0.2」と「OD錠0.3」	1
ボグリボース	「錠0.2mgマイラン」と「錠0.3mgマイラン」	3
	「OD錠0.2mgサワイ」と「OD錠0.3mgサワイ」	2
	「錠0.2mgトーフ」と「OD錠0.2mgトーフ」	1
	「錠0.2mgファイザー」と「錠0.3mgタイヨー」	1
メタクト配合錠	「LD」と「HD」	1
メトグルコ錠	「250mg」と「500mg」	1

※薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業「平成25年年報」P402-403図表8-9