❻「共有すべき事例」の再発・類似事例

小児において年齢別に処方量や剤形が異なる医薬品

ヒヤリ・ハット事例のうち、「小児において年齢別に処方量や剤形が異なる医薬品に関する事例」が２３件報告されています（集計期間：２０１５年１月１日～１２月３１日）。特に注意を要する医薬品を以下に示します。

ブランド名（成分名）	剤形（規格）	小児の年齢別用法・用量	
気管支拡張剤			
ホクナリン（ツロブテロール）	テープ（0.5mg、1mg、2mg）	0.5歳～　3歳未満	1回0.5mg　1日1回
		3歳～　9歳未満	1回1mg　1日1回
		9歳～	1回2mg　1日1回
その他のアレルギー用薬			
アレグラ（フェキソフェナジン塩酸塩）	ドライシロップ（5%）	0.5歳～　2歳未満	1回15mg（製剤量0.3g）1日2回
		2歳～　7歳未満	1回30mg（製剤量0.6g）1日2回
		7歳～12歳未満	1回30mg（製剤量0.6g）1日2回（適宜増減可）
		12歳～	1回60mg（製剤量1.2g）1日2回（適宜増減可）
	錠・OD錠（30mg、60mg）	7歳～12歳未満	1回30mg　1日2回（適宜増減可）
		12歳～	1回60mg　1日2回（適宜増減可）
アレロック（オロパタジン塩酸塩）	顆粒（0.5%）	2歳～　7歳未満	1回2.5mg（製剤量0.5g）1日2回
		7歳～	1回5mg（製剤量1g）1日2回
	錠・OD錠（2.5mg、5mg）	7歳～	1回5mg　1日2回
キプレス（モンテルカスト）	細粒（4mg／0.5g／包）	1歳～　6歳未満	1回4mg（製剤量0.5g1包）1日1回
	チュアブル錠（5mg）	6歳～	1回5mg　1日1回
クラリチン（ロラタジン）	ドライシロップ（1%）	3歳～　7歳未満	1回5mg（製剤量0.5g）1日1回
		7歳～	1回10mg（製剤量1g）1日1回
	錠・レディタブ錠（10mg）	7歳～	1回10mg　1日1回
ザイザル（レボセチリジン塩酸塩）	シロップ（0.05%）	0.5歳～　1歳未満	1回1.25mg（製剤量2.5mL）1日1回
		1歳～　7歳未満	1回1.25mg（製剤量2.5mL）1日2回
		7歳～15歳未満	1回2.5mg（製剤量5mL）1日2回
	錠（5mg）	7歳～15歳未満	1回2.5mg　1日2回
ジルテック（セチリジン塩酸塩）	ドライシロップ（1.25%）	2歳～　7歳未満	1回2.5mg（製剤量0.2g）1日2回
		7歳～15歳未満	1回5mg（製剤量0.4g）1日2回
	錠（5mg）	7歳～15歳未満	1回5mg　1日2回

※　薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業 平成２７年年報２３５頁　図表６－４を改変

公益財団法人　日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
〒101-0061　東京都千代田区三崎町1-4-17 東洋ビル　電話：03-5217-0281（直通）　FAX：03-5217-0253（直通）
http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/